

# CHICOREE

2 espèces :

*Cichorium intybus* (chicorées rouges, pain de sucre, endives)

*Cichorium endivia* (Scaroles et Frisées)

## Culture

Distance d'isolement entre 2 variétés : 500 m, ou en cas de risques :

- Protection sous voile anti-insecte avec ruchette ou ouverture alternative entre plusieurs variétés,
- Elimination des chicorées sauvages dans un rayon de 500 m,
- Ne produire qu'une variété par an,
- Décaler la plantation.

**ATTENTION : C. Intybus, croisement possible avec les chicorées sauvages et possiblement avec C. endivia**

*C. endivia* ne s'hybride pas avec *C. intybus*

Certaines variétés peuvent être cultivées en bisannuelles pour la production de semences.

**Du semis à la récolte des graines : env. 15 mois**

**Période de récolte approximative : août**

## Récolte et processus d'extraction

La récolte est capricieuse : la graine peut tomber seule ou au contraire être difficile à extraire, notamment par temps pluvieux lors de la maturation. Il est préférable de récolter la plante entière avant complète maturité (autour du mois d'août) et de faire sécher dans un endroit sec et ventilé sur un drap ou un tissu.

Frictionner les sommités florales pour extraire les graines.

## Informations générales

**Cycle :** Annuelle

**Reproduction :** Allogame

**Degré de fécondation croisée :** Minimal

**Fécondation :** Entomophile

**Dépression de consanguinité :** Basse

**Nombre mini de porte-graines :** 30

**Estimation de production :** 7 à 10g/pied

**Espacement conseillé (sur planche 1,2m) :**  
3 rg x 40

## Semences

**Durée germinative :** 10 ans et plus

## Critères de Sélection du réseau

Correspondance aux critères de la variété sélectionnée (forme et taille)

Resistance à la montaison (prélever les semences des plants qui montent le plus tardivement)